

AVERTISSEMENTS AGRICOLES



STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE
DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE
ET DE LA FORÊT
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Ancienne Conserverie de CASAMOZZA
LUCCIANA - 20290 - BORGO

Tél. 95.36.05.70



EDITION CORSE

Bulletin Technique N° 181
du 17 Septembre 1990

- Le point sur les **cératites**
- Traitement à la chute des feuilles sur les **cerisiers**
- Cicadelles vertes sur **amandiers**

KAKIS, AGRUMES

--> Situation

Les piègeages effectués depuis la fin août par la protection des végétaux et la Chambre d'Agriculture de Haute Corse permettent actuellement de dégager les points suivants :

- Dans les kakis

Les captures restent faibles sur LUCCIANA, VESCOVATO, VENZOLASCA. Par contre la population est abondante sur BORGO (environnement de pêchers et pruniers).

- Dans les kiwis

Les captures sont en règle générale nulles.

- Dans les clémentiniers

Des postes de piègeages ont été installés en de nombreux vergers. Actuellement les captures deviennent abondantes sur ALERIA, AGHIONE, GHISONACCIA, PRUNETTE, SAN GIULIANO. Elles le sont d'autant plus que le verger est à proximité de vergers de pêchers, et abricotiers.

--> Préconisation

Actuellement les fruits ne sont pas suffisamment murs pour attirer réellement les cératites. Certes, certains kakis commencent à se colorer, mais l'ensemble des fruits reste encore peu attractif. Toutefois, le "réservoir" de cératites est considérable. Elles ont trouvé tout au long de l'année différents hôtes qui leur ont permis de s'alimenter. On les trouve même actuellement sur raisins. Il est donc prudent de diminuer dès maintenant le stock de population qui arrive.




Fig. 31. — Mouche méditerranéenne, femelle (d'après BOSSY, 1985).

P. 28

:
:
:
: **Attention** , ne traitez pas n'importe comment.
: Vous détruiriez les insectes auxiliaires.
: Préférez pour l'instant un traitement partiel.
:
:

--> Stratégie

Pour le moment, utilisez un mélange BUMINAL (hydrolysate de protéines) + un insecticide (voir liste ci-jointe) . Faites les rangs de bordure et une rangée sur quatre par exemple. Après avoir réalisé le traitement, vous replacerez votre piège à guêpe rempli de phosphate d'ammoniaque à 30 g/litre. Dès que les captures remonteront et si les fruits commencent à se colorer, il faudra faire une deuxième intervention , vraisemblablement en totalité. Le prochain bulletin fera le point.

** Remarque **

Vous pouvez également utiliser des diffuseurs à base de trimedlure, mais ce type de piège est diffusé par une entreprise du continent. D'autre part, si le piège phosphate d'ammoniaque est facile à utiliser et peu onéreux, il nécessite d'être observé régulièrement (au moins deux fois par semaine) et vidé . Le liquide doit également fester propre et être renouvelé.

Enfin, la relation entre nombre de captures et seuil de traitement n'est pas fiable. Il est plus intéressant de noter :

- l'arrivée de la population de cératites dans la parcelle.
- L'évolution de cette population en relation avec les conditions climatiques et les traitements.

CERISIER

Le traitement d'automne à base de **cuivre** peut être réalisé dès maintenant.

AMANDIERS

Les **cicadelles vertes** ont été observées dans de nombreux vergers. Les dégâts sont importants. Actuellement seul le formothion (ANTHIOFORT) bénéficie d'une homologation sur cicadelles des arbres fruitiers.

.../...

MATIERES ACTIVES UTILISABLES CONTRE LA MOUCHE MEDITERRANNEENNE

=====

Mélanger le BUMINAL à un insecticide homologué

<u>Matière active</u>	<u>Spécialité</u>	<u>Action</u>	<u>Dose</u>	<u>Délai avant récolte</u>
- Dimethoate	N.S.	Systémique contact ingestion	30 g/hl	7 jours
- Formothion	ANTHIOFORT	Systémique contact (action lente)	40,56 g/hl	7 jours
- Fenthion	LEBAYCID	Contact ingestion inhalation	55 g/hl	15 jours
Ces produits ont une persistance d'action de deux à trois semaines.				
- Malathion	N.S.	Contact ingestion vapeur	100 g/hl	7 jours
Persistance d'action 8 jours				
- Trichlorfon	DIPTEREX 80	Contact ingestion inhalation	100 g/hl	7 jours
Persistance d'action 10 à 15 jours				